

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ

29.03.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата *Мексидол-Вет*[®]

(Организация - разработчик: ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»,
Россия, 115407, город Москва, улица Судостроительная,
дом 41, этаж 1, помещение 12)

Номер регистрационного удостоверения:

44-3-6.15-4443 N ПВР-3-5.6/01432

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мексидол-Вет[®]
Группировочное наименование: Этилметилгидроксипиридина
сукцинат.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Состав на 1 мл:
Действующее вещество: Этилметилгидроксипиридина сукцинат – 25 мг
или 50 мг;
Вспомогательное вещество: вода для инъекций до 1мл.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную
или слегка желтоватую жидкость.
Срок годности препарата - 3 года. Не применять по истечении срока
годности.
4. Препарат выпускают по 1 мл (раствор для инъекций с концентрацией 25
мг/мл), 2 мл и 5 мл (раствор для инъекций с концентрацией 50 мг/мл) в ампулах
из стекла с точкой разлома белого цвета и тремя маркировочными кольцами
(верхнее – желтое, среднее – белое, нижнее – красное). На ампулу наклеивают
этикетку самоклеящуюся. По 5 ампул упаковывают в контурную ячейковую упа-
ковку из пленки поливинилхлоридной. По одной контурной ячейковой упаковке
(для фасовки по 5 мл) или по две контурные ячейковые упаковки (для фасовок по
1 мл и 2 мл) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защи-
щенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов
и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Мексидол-Вет[®] следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Мексидол-Вет[®] относится к фармакотерапевтической группе антигипоксантов и антиоксидантов.

10. Мексидол-Вет[®] обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами. Препарат повышает устойчивость организма к воздействию свободных радикалов, приводящих к кислородозависимым патологическим состояниям (шок, гипоксия, ишемия), улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, стабилизирует мембранные структуры тромбоцитов и эритроцитов при гемолизе, обладает гиполипидемическим действием, снижает содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Мексидол-Вет[®] ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, улучшает синаптическую передачу и транспорт медиаторов.

Механизм действия препарата заключается в способности вызывать усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижать степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии, с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата; активизировать энергосинтезирующую функцию митохондрий.

При парентеральном введении препарат быстро поступает в кровь, органы и ткани животного. Выводится из организма преимущественно с мочой, в основном в глюкуроноконъюгированной форме.

Мексидол-Вет[®] по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. Мексидол-Вет[®] назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью самостоятельно и в комплексной терапии:

- при острой и хронической сердечно-сосудистой и легочной недостаточности;
- при интоксикациях, вызванных острыми гнойно-воспалительными процессами (острый некротический панкреатит, перитонит);
- с целью профилактики наркозных и постнаркозных осложнений, в посттравматический и послеоперационный периоды, в том числе при черепно-мозговых травмах;
- при патологии кожных покровов (дерматиты, экземы, трофические язвы, раны), для улучшения состояния кожно-волосного покрова;
- в ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма.

12. Противопоказания для применения: острые нарушения функции печени и почек, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

13. При работе с препаратом Мексидол-Вет[®] следует соблюдать общие правила техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Мексидол-Вет[®]. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата).

14. Применение препарата беременным и кормящим животным, щенкам и котятм до 2-х месячного возраста при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача.

15. Терапевтическая доза лекарственного препарата зависит от тяжести клинического состояния животного. В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 10-15 мг на 1 кг массы животного, затем её снижают до 5 мг на 1 кг массы животного. Курс лечения составляет 5 - 15 дней.

В целях профилактики наркотических и постнаркотических осложнений препарат применяют за 2-3 дня до операции, в послеоперационный период – в течение 2-3 дней после операции два раза в день в дозе 10-15 мг на 1 кг массы животного. При длительном наркозе, тяжелом клиническом состоянии животного препарат вводят в период операции дробно в дозировке 20 мг на 1 кг массы животного.

В качестве лечебно-профилактического средства в ветеринарной гериатрии Мексидол-Вет[®] применяют собакам и кошкам старше 7 лет внутримышечно в дозе 10 мг на 1 кг массы животного два раза в сутки в течение 5-7 дней с интервалом 3 - 4 месяца.

Мексидол-Вет[®] вводят собакам и кошкам внутримышечно или внутривенно. При внутривенном способе введения препарат разводят водой для инъекций или физиологическим раствором в 2 и более раза.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. Внутривенное введение лекарственного препарата может сопровождаться болезненностью.

17. При передозировке возможно развитие сонливости. Лечение: симптоматическая терапия.

18. Применение препарата Мексидол-Вет[®] не исключает использования других лекарственных средств патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особенности действия при первом приеме препарата или при его отмене не выявлено.

20. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс лечения необходимо возобновить в соответствии с предусмотренной схемой применения и дозировками.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ФКП «Армавирская биофабрика»,
Россия, 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Прогресс, ул. Мечникова, д.11.
Тел: +7 (86195) 2-12-11
Тел./факс: +7 (86195) 2-15-25

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»,
Россия, 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41, этаж 1, помещение 12
Тел./факс: +7 (495) 626-47-55

Первый заместитель
Генерального директора
ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»



А.А. Забозлаев